



Legemidler - Blandekort, Hydroksokobalamin, Cyanokit

D56212

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

V03A B33	ANTIDOT			
	HYDROKSOKOBALAMIN Cyanokit®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = Kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Hettgl, 5 g inf. subst	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Tørrstoff a 5 g løses i 200 ml fortynningsvæske. Bruk medfølgende overføringskanyle. Vend hetteglasset forsiktig i minst 1 minutt	<u>IV infusjon:</u> Første dose gis over 15 minutter. Andre dose gis over 15-120 minutter etter legens ordinasjon Medfølgende infusjonssett skal brukes	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Hetteglass:</u> 6 timer i RT	Ikke rist hetteglass, pga skumdannelse Rød urin, røde slimhinner og rød misfarging av hud er vanlig
Kilder: Produktomtale (SPC), Direktoratet for medisinske produkter: Cyanokit Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket Maler i MetaVision				