

Legemidler - Blandekort, Nalokson

D56214

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

V03A B15	ANTIDOT			
	NALOKSON			
	Naloxon B.braun, Naloxon Hameln, Naloxone Accord			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
0,4 mg/ml Ampulle, 1 ml Ferdigfylt sprøyte (Accord), 1 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet eller fortynnes til egnet volum <u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 0,04 mg/ml: 5 ml (2 mg) fortynnes med 45 ml fortynningsvæske <u>IV kontinuerlig infusjon, volumpumpe:</u> Konsentrasjon 0,02 mg/ml: 5 ml (2 mg) fortynnes i 95 ml fortynningsvæske	<u>IV injeksjon:</u> 0,4 mg gis over få sekunder i en stor vene* Kan gjentas hvert 1.-3. minutt inntil normal respirasjon <u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> Etter legens ordinering <u>IV kontinuerlig infusjon, volumpumpe:</u> Etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampulle:</u> Engangsbruk <u>Ferdigfylt sprøyte:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer i RT	OBS Tromboflebitt Ekstravasasjon kan gi vevsskade *Kan gis IM eller SC ved manglende IV- tilgang
Kilder: Produktomtale (SPC), Direktoratet for medisinske produkter: Naloxon B.Braun , Naloxon Hameln , Naloxone Accord Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket Maler i MetaVision				