

Legemidler - Blandekort, Kalsiumfolinat

D56220

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

V03 F03	ANTIDOT			
	KALSIUMFOLINAT Kalsiumfolinat LumaCina®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Inj.væske 10 mg/ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre	<u>IV injeksjon:</u> Gis over 3-5 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid	Antidot for forgiftninger med metotreksat og metanol
Amp, 10 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV infusjon:</u> Fortynnes i 100-250 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Gis etter legens ordinasjon	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Kan gi anafylaksi/alvorlige allergiske reaksjoner
Kilder: Produktomtale, SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Kalsiumfolinat LumaCina Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket Medicines Complete, Injectable Drugs Guide				