



Legemidler - Blandekort, Levokarnitin

D56221

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

A16AA01	ANTIDOT			
	LEVOKARNITIN Carnicor Alfasigma (ureg)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
200 mg/ml (1 g/5 ml)	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre	<u>IV infusjon, metningsdose:</u> Gis over 30-60 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid	Brukes ved alvorlig valproinsyreforgiftning
Amp, 5ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV infusjon, metningsdose:</u> Dosen fortynnes med egnet volum fortynningsvæske <u>IV infusjon vedlikeholdsdose:</u> Kan gis ufortynnet eller fortynnes med egnet volum fortynningsvæske	<u>IV infusjon, vedlikeholdsdose:</u> Gis over 10-30 minutter	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	OBS Tromboflebitt Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Kan gi smerte på injeksjonsstedet
<u>Kilder:</u> Spansk produktomtale SmPC (via Alliance Healthcare): Carnicor Alfasigma Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket				