

Legemidler - Blandekort, Silibinin

D56222

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
18.07.2026

Side 1 av 1

V03AB	ANTIDOT				
	SILIBININ				
	Legalon SIL Madaus (ureg)				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
Inf.subst 350 mg*	<u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml NaCl 9 mg/ml Konsentrasjon 10 mg/ml: 1 hetteglass tørrstoff løses i 35 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Fortynnes i 100–250 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Gis på volumpumpe etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Stamløsning:</u> 24 timer K <u>Fortynnet løsning:</u> 6 timer RT 24 timer K	* Silibinin 350 mg tilsvarer 528,5 mg dinatriumsilibinin- hydrogensuccinat
<u>Kilder:</u> Tysk produktinformasjon, SmPC, Legalon SIL Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket					