



Legemidler - blandekort, Vitamin K1 (fytomenadion)

D56223

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

ANTIDOT

B02B A01

VITAMIN K1 (FYTOMENADION)

Konakion Novum®, Konakion MM (ureg)

Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Inj.væske 10 mg/ml Amp, 0,2 ml (Novum) 1 ml (MM)	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Kan gis ufortynnet eller fortynnes i 10-20 ml fortynningsvæske <u>IV infusjon:</u> Fortynnes i 50 ml fortynningsvæske	<u>IV injeksjon:</u> Ufortynnet løsning gis langsomt over minst 30 sekunder. Fortynnet løsning gis over 3-5 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis over 15-30 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	Antidot til Warfarin Kan gi anafylaksi/alvorlige allergiske reaksjoner Skal ikke brukes hvis løsningen er uklar 0,2 ml brukes primært til nyfødt

Kilder:

Produktomtale, SmPC, Electronic medicines compendium EMC: [Konakion MM](#)
[Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger \(Antidotlisten\)](#) - Helsebiblioteket
 Medicines Complete, Injectable Drugs Guide