



Flekkdesinfeksjon

D07375

Utgave:
6.01Gjelder fra:
12.01.2024

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

Flekkdesinfeksjon benyttes ved synlig søl av biologisk materiale på et klart avgrenset område på overflater eller utstyr.

Flekkdesinfeksjon bør foretas umiddelbart etter søl med organiske materiale for å unngå inntørking og for å redusere smittefaren.

Ansvar/målgruppe

Den som søler eller oppdager søl av blod/ kroppsvæsker skal utføre flekkdesinfeksjon.

Handling

Ta på beskyttelsesutstyr og bland opp det kjemiske desinfeksjonsmidlet i henhold til bruksanvisningen.

- Ta på usterile engangshansker og eventuelt ekstra beskyttelsesutstyr
- Fjern organisk materiale (blod/kroppsvæsker) med tørkepapir eller cellestoff, gjerne fuktet med desinfeksjonsmiddel og kast det i smitteavfall.
- Bearbeid og dekk området med desinfeksjonsmiddel. Evt. benytt desinfeksjonsklut. La det virke i angitt virketid.
- Dersom søl/flekker med organisk materiale har tørket inn, fukt engangsklut/cellestoff med desinfeksjonsmiddel og la det ligge på området hvor det er søl. Dekk om nødvendig området med absorberende materiale fuktet med desinfeksjonsmiddel.
- La det virke i angitt virketid. Tørk av og kast det i smitteavfall.
- Hvis det fortsatt er synlig forurensning påfør desinfeksjonsmiddel på nytt.
- Etter angitt virketid tørkes området med ren fuktig klut.
- Inspiser og forsikre deg om at flatene er rene etter desinfeksjonen.

Viktig: Desinfeksjonssprit 75 % **skal ikke** brukes til flekkdesinfeksjon fordi denne fordampes raskt og det blir for kort virketid.

Referanser

<https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av-desinfeksjonsmidler>

<C:\Users\SVENAR~1\AppData\Local\Temp\mso8FBD.tmp> (sykehuset-innlandet.no)

<C:\Users\SVENAR~1\AppData\Local\Temp\msoA1F7.tmp> (sykehuset-innlandet.no)