



Tuberkulose

D07389

Utgave:
3.02

Gjelder fra:
16.05.2024

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

Å hindre smitteoverføring til andre pasienter, personalet og miljø.

Ansvar/målgruppe

Avdelingsledelse har ansvar for å gjøre prosedyren kjent, og ansatte har ansvar for og etterleve prosedyren.

Handling

Tuberkulose er lite smittsomt sammenliknet med mange andre sykdommer, og smitte forutsetter vanligvis tett samvær over tid. Tuberkulosesmitte skjer gjennom luftbåren spredning av tuberkulosebakterien fra en person med lungetuberkulose.

Smitteveier og isolering

- Ved aktiv og ubehandlet lungetuberkulose skjer spredningen via små dråper i luften ved hoste/nysing.
- Etter ca 14 dagers behandling av lungetuberkulose er smittefaren ikke til stede/svært liten.
- Ved tuberkulose i andre organer vurderes behov for isolering etter smitterisiko og pasientens tilstand.
- Tuberkulose i abcesser o.l kan være smitteførende, isoleringstiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle av lege.

Referanser

[Tuberkulose - FHI](#)

[Tuberkuloseveilederen - FHI](#)

[EX.01.07-05](#)

[EX.01.13-11](#)

[EX.01.13-15](#)

[Isolering - Luftsmitte - dørplakat \(rød\)](#)

[Desinfeksjon - PeraSafe. Plakat blandingsprosedyre.](#)

[Desinfeksjon - smittevask/opphør av isolering](#)