



Øye - Aniridi linse, operasjon

D34085

 Utgave:
6.01

 Gjelder fra:
08.12.2025

Side 1 av 2

Definisjon	Erstatte iris med en linse som festes i sclera. (Aniridi-linse, sclera-fiksert)
Instrumenter	<p>Catarakt/Glaukomskrin Spesialinstrumenter / skrin til forkammerlinse (Vericyse) Evt. høyre/venstre cornea-saks Diatermi til phaco-maskina Crescent-kniv Bevel up Ophthalmic Knife 15 grader 500 ml BSS skyllevæske tilsatt 0,5 ml Adrenalin 1 mg/ml (= 0,5 mg Adrenalin i 500 ml BSS) Viscoelastica (ProVisc): 2 stk. Cefuroxim 10 mg/ml, 0,1 ml i øyets forkammer Eventuelt kanyle, 30 G ½ - 0,3 x 13 mm, gul kanyle (for å få fram ski-tupp-nålen) Eventuelt Pilocarpin 4 % Spyd Tetracain 1% øyedråper</p>
Dekking/Utstyr	<p>Phacomaskin (Slås på, innstilles på operatør) Slangesett Dual Pump Pack 0PO73 Mikroskop Standardpakke Innlandet</p>
Knivblad	
Suturer	<ul style="list-style-type: none"> • Vicryl rapid 8-0 (til conjunctiva) • Dafilon 10-0 (G1118722), evt. 9-0 m/skjærende nål. • 2 stk. Prolene 10-0, STC – 6, Dobbeltarmert rett nål eller • 2 stk. Prolene 10-0, CSS-160, Dobbeltarmert rett nål med «skitupp» form (Spør operatør hvilken sutur som er aktuell)
Preoperativ forberedelse	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollere øyet som skal opereres • Gi 1g Paracet tablett <p>Hvis pasienten er engstelig: Gi Sobril tablett per os, etter legens forordning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuelt dryppes av sykepleier ½ time før operasjon: Voltaren 1 mg/ml, 1 dråpe. Etter forordning av lege • Forberedelser i operasjonsslusa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hette over håret ○ Frakk • GF vil ha med en assistent under operasjonen.

	Anestesi: <ul style="list-style-type: none">• Dråper: Tetrakain 1 %, 4-5 dråper.• Lidocaine Accord 10 mg/ml injeksjonsvæske uten konserveringsmiddel.• Eventuelt Xylocain 10 mg/ml med Adrenalin 5 mikrogram/ml – til lokalinjeksjon
Leiringsutstyr	
Leiring	Ryggleie
Huddesinfeksjon	Øye - Preoperativ desinfeksjon med Betadine 5%
Dekking	
Drenasje	
Bandasje	
Merknader	Operatør sitter «kl. 12» hvis linse allerede er fjernet. Operatør sjekker at linsen er på plass og riktig. Etter operasjon: <ul style="list-style-type: none">• Pasienten skal være i ro den første halvtimen.• Ved smerter hos voksne pasienter: Gi 1 g Paracet. Hvis dårlig effekt av smertestillende, kontakt lege.• Send med pasienten relevant skriftlig pasientinformasjon.
Arbeidsbeskrivelse:	

Referanser

[SI/17.26-15](#)

[SI/17.28.01.26-01](#)

[SI/17.28.03.26-01](#)

[SI/17.28.03.26-02](#)

[Øye - Preoperativ desinfeksjon med Betadine 5%](#)

[Pasientinformasjon nett - Grå stær \(katarakt\) - operasjon](#)

[Pasientinformasjon - Grønn stær](#)

[Pasientinformasjon - Grønn stær \(glaucoma\), engelsk](#)