



Cholecystitt - Observasjoner og tiltak

D38276

Utgave:
4.00Gjelder fra:
09.07.2025

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Kvalitetssikre observasjoner, tiltak og behandling til pasienter med cholecystitt.
- Forebygge komplikasjoner, redusere liggetid og bidra til økt pasienttilfredshet.

Ansvar/målgruppe

- Alt helsepersonell som behandler pasienter med cholecystitt i sengepost.

Handling

Bruk aktuell divisjonsprosedyre for Øyeblikkelig hjelp – rutiner ved innleggelse sengepost.

- Registrer vitale parametere, følg prosedyre [NEWS2 - Ansvar og gjennomføring](#)
- Administrer antibiotika som forordnet
- Observer tegn til peritonitt; frostanfall og/eller forverring i almenntilstand
- Kartlegg kliniske tegn på gallestase; ikterus, mørkebrun urin og kittfarget, fettaktig avføring
- Ved perforasjonstruet, inoperabel cholecystitt kan det være aktuelt å drenere galleblæren percutant (drensinnleggelse gjennom huden og inn til galleblæren). Dette utføres ultralydveiledet på røntgenavdelingen. Pasienten skal faste 4-6 timer før prosedyren.
- Før ultralydveiledet drenasje; Bestill INR og Trombocytter etter forordning av lege
- Før operasjon; se om det foreligger gyldig blodscreening/-typing, bestill hvis dette ikke foreligger

Ved percutant galledren

- Registrer farge, konsistens og mengde som kommer på galledrenet. Mengde pr. døgn føres i væskeregnskap. Følg avdelingens rutine.
- Observer innstikkstedet med tanke på tegn til blødning, hematom, lekkasje
- Pasienten kan vanligvis drikke og/eller spise fettredusert kost, gå gjennom [Pasientinformasjon - Kostråd, fettredusert kost \(brosjyre\)](#) når diagnose er stilt. Avklar med lege.

Ved utreise

- Avklar med lege angående resepter og sykmelding
- Ved konservativ behandling uten perkutan drenasje: Sørg for avtale om eventuell elektiv innleggelse etter 2–3 mnd for cholecystectomi
- Ved percutan drenasje: Sørg for avtale om reinnleggelse til cholangiografi før fjerning av dren og eventuell elektiv innleggelse senere for cholecystectomi

Utgave: 4.00	Cholecystitt - Observasjoner og tiltak	D38276 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

Referanser

- [SI/17.16.01-05](#) [Pretransfusjonsrutiner - Anbefalinger](#)
[SI/17.27-13](#) [NEWS2 - Ansvar og gjennomføring](#)
[SI/17.28.03.07.02-05](#) [Pasientinformasjon - Kostråd, fettreduert kost \(brosjyre\)](#)

Eksterne referanser

1. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Kolecystitt, akutt [Internett]. [oppdatert 19. sep 2022; hentet 28. okt. 2022]. Tilgjengelig fra: <https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/magetarm/tilstander-og-sykdommer/galleveier/kolecystitt-akutt>
2. Norsk Helseinformatikk. Betennelse i galleblæren – kolecystitt [Internett]. [oppdatert 09. des. 2021; hentet 28. okt. 2022]. Tilgjengelig fra: <https://nhi.no/sykdommer/magetarm/galleveier/betennelse-i-galleblaren/?rel=copylink&hp=true>