

Øye - Spesialøyedråper, administrering

D39657

Utgave:
3.03

Gjelder fra:
19.08.2025

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Sikre riktig administrering av spesialøyedråper som lages til og brukes ved behandling av Keratitt ved øyeavdelingene
- Gjelder preparatene Cefuroxim og Gentamicin

Ansvar/målgruppe

- Øyelege er ansvarlig for forordning av behandlingen
- Sykepleier utfører tilberedning av øyedråper og administrerer forordnet behandling

Handling

Cefuroxim 50 mg/ml (Zinasef)

- Cefuroxim 250 mg løses opp i 5 ml sterilt vann og trekkes opp i 10 ml sprøyte
- Sprøyten påsettes sprøyte-propp og brukes som «øyedråpeflaske».
Holdbarhet: 24 t.
- Merkes: «Cefuroxim øyedråper 50 mg/ml. Anvendes før (dato)*** kl.***»

Forsterket Gentamicin (15 mg/ml)

- Bruk 10 ml sprøyte og trekk opp både 5 ml Gentamicin - pos* 5 mg/ml og 2 ml Gensumycin 40 mg/ml injeksjonsvæske i samme sprøyte (= til sammen 7 ml)
- Vend sprøyten slik at luftboblen blander innholdet
- Sprøyten påsettes sprøyte-propp og brukes som «øyedråpeflaske».
Holdbarhet: 24 t.
- Merkes: «Forsterket Gentamicin øyedråper. Anvendes før (dato)*** kl.***»
- Gentamicin – pos øyedråper 5 mg/ml bestilles som uregistrert preparat

Referanser

[Felleskatalogen](#)