

Ulcus - OAL 10 dager, 3. linjekur mot helicobacter pylori etter dyrkning

Utgave:
Gjelder fra:
Side:
3.00
14.03.2022
1 av 2

Pasientdata

Rp. **Omeprazol tabl 20 mg, No 56**
Dssn. 2 tabl. 2 ganger daglig i 10 dager.
Tas sammen med måltid.

Rp. **Amoxicillin tabl 750 mg, No 40**
Dssn. 1 tabl. 3 ganger daglig i 10 dager.
Tas sammen med måltid.

Rp. **Levofloxacin 250 mg, No 20**
Dssn. 1 tabl. 2 ganger daglig i 10 dager.
Tas sammen med måltid.

Dato:

.....
Lege (stempel og signatur)

- Hovedårsaken til magesår er en kronisk infeksjon forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Får man bukt med denne bakterien gjennom en effektiv antibiotikabehandling, er sjansen stor for å bli frisk og ikke få tilbakefall av magesår. Noen ganger lykkes man ikke ved første eller andre forsøk med antibiotika.
- Du har nå fått foreskrevet en forsterket trippelkur i 10 dager som består av en sterk syrehemmer (omeprazol, esomeprazol, pantoprazol eller lansoprazol) og to typer antibiotika, Amoxicillin og Levofloxacin (Tavanic). Det er vanligvis få bivirkninger forbundet med kuren. De vanligste er magesmerter, kvalme, løs avføring og metallsmak i munnen. Dette er ufarlige bivirkninger, og det er svært viktig å gjennomføre kuren. Hvis du er allergisk for penicillin må Amoxicillin erstattes med et annet antibiotikum.

Kontakt lege hvis bivirkningene blir plagsomme.

Syrehemmer tas 2 ganger daglig, amoxicillin 3 ganger daglig og levofloxacin 2 ganger daglig – all tablettene tas sammen med måltid.

- Etter 2 -3 måneder innkalles du til gastroskopi og/eller pusteprøve som viser om behandlingen har vært vellykket. Hvis symptomene kommer tilbake kontaktes egen lege.

Resept