

Øye - Strabisme, operasjon

D42246

 Utgave:
3.02

 Gjelder fra:
24.05.2023

Side 1 av 3

Hensikt og omfang

- Korrigere skjeling
- Justering av muskler

Ansvar/målgruppe

- Helsepersonell som har kompetanse på strabisme

Handling

Preoperative forberedelser

- Alle pasienter fyller ut helseopplysninger før de søkes til strabismeoperasjon i narkose
- Legg inn perifert venekateter, følg prosedyre [Perifert venekateter \(PVK\): innleggelse](#).
- Premedikasjon:
 - Ved narkose: Gis på kirurgisk dagpost, følg prosedyre [Øye - Kirurgi, preoperativt og postoperativt](#)
 - Ved lokalbedøvelse til voksne dagpasienter: Gi pr. os:
 - Sobril 10 mg tbl.
 - Paracet 1 gr. tbl.
 - Afipran 10 mg tbl.

Ved lokal operasjon - Forberedelser i operasjonsslusen

Påkledning

- Hette - gjelder alle
- Frakk - til pasient som opereres i lokalbedøvelse

Leie

- Ryngleie
- Pute under knærne
- Hodet stabilt i vakumpute
- Armene på polstrede armbord
- Mål BT og SpO2, tilkobles transportabelt apparat

Anestesi

Utgave: 3.02	Øye - Strabisme, operasjon	D42246 Side 2 av 3
-----------------	-----------------------------------	-----------------------

Barn og voksne i narkose

- Marcain 2,5 mg/ml – 0,3 ml (spør operatør) ved hver muskel som opereres, settes peribulbært

Voksne i lokalanestesi

- Øyedråper: Oxibuprocain 4mg/ml (0,4%) 4–5 dråper
- Peribulbær inj.: Xylocain 10 mg/ml med adrenalin 5 mikrogr./ml. Ev. uten adrenalin ved kjent kontraindikasjon til adrenalin. Hør med operatør.
- Marcain 2,5 mg/ml – 0,3 ml (spør operatør) ved hver muskel per-operativt.

Huddesinfeksjon

- Klorhexidin 1 mg/ml

Utstyr

- Standardpakke Innlandet. Ved operasjon av begge øyne: Barrier Ophthalmic Drap W/pouches PCS 14 (dobbel hullduk).
- Strabismeskrin
- Westcott tenotomisaks (EZ)
- Eventuelt Prinz til obliques, barn; høyre - ved operasjon venstre øye, venstre - ved operasjon høyre øye
- Eventuelt spesialkanyle til retrobulbær injeksjon, engangs (v/lokal)
- NaCl 9 mg/ml
- Tobrasone øyedråper
- Battericauter
- Q-tips, sterile
- Øyeskjold med plaster

Sutur

- 1 stk PremiCron 6-0 holdesutur. **Ikke ved obliques**
- 2 stk Vicryl 8-0 Rapid (**ved obliques og elongation: 1 stk**).
- Ta bare opp 1 stk. sutur Vicryl 6-0 ved reseksjon og fremlegging. 1 stk Vicryl 7-0 ved tilbakelegging av obliques og rette muskler
- Ta opp 1 stk sutur Mersilene 6-0 ved folding og elongation av øyemuskler

Bandasje

- Skjold med plaster, men drypp først 1-2 dråper Tobrasone øyedråper i det opererte øyet etter operasjonen er slutt
- Send med 1 stk ekstra skjold evt. 2 stk ved opr. på begge øyne, til bruk om natten. (Legg dette i plastpose med pasientens navn på).
- Ved retrobulbær anestesi: 2 stk Eye-pad.

Eventuelt ved reoperasjon

- Healon 5 (kun v/reoperasjon)
- Kenacort, eller Depot-Medrol 40mg/ml (kun v/reoperasjon)

Folding av m. Obliques Superior

Utstyr ekstra

- 1 stk muskelfolder E-20304 STORZ
- 1 stk sjelehake til små barn, Jameson

Elongation

Utstyr ekstra

- Jameson hake
- 2 prinz pinsetter

Hummelsheim metode/strabisme operasjon

- Utføres ved nervus abucens parese
- Øyelegen bør ha med seg en assistent i tillegg til ass. operasjonssykepleier

Utstyr

Ikke ta opp holdetråd.

- 1 stk. Vicryl 6-0, dele tråden (+ 1 stk. Vicryl 6-0, hvis reseksjon av MRL i tillegg)
- 1 stk. Mersilene sutur 6-0. Her deles tråden, 2 x s-14 nåler.
- 1 stk. Vicryl 8-0 rapid, til konjunktiva
- 1 skjelehake Jameson
- BTX-A til injeksjon i MRM på samme øye som opereres eller 1 stk Vicryl 7-0, ved tilbakelegging av MRM

Referanser

[SI/17.34-01](#)

[Perifert venekateter \(PVK\): innleggelse](#)

[SI/17.34-04](#)

[Perifert venekateter \(PVK\): fjerning](#)

[E-H01/17.26.01-38](#)

[Øye - Kirurgi, preoperativt og postoperativt](#)