



Prehospital - Blødning etter tonsillektomi

D42677

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
24.05.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Sikre at alle pasienter som har begynt å blø etter tonsillektomi får ambulanse raskt og transporteres **direkte** til nærmeste sykehus med ØNH-lege (SI-Gjøvik / SI-Elverum)

Dette gjelder også

- Blødninger som har stoppet før ambulanse ankommer pasienten
- Pasienter som har blitt operert på institusjoner utenfor SI, men som ved blødningstidpunkt befinner seg innenfor SI sitt geografiske område

Blødningsfaren varer i 14 dager etter kirurgi, men kan forekomme enda senere i sjeldne tilfeller.

Ansvar/målgruppe

- Alt personell på AMK
- Alt personell som jobber prehospitalt

Handling

- **Alle pasienter** som har blødning etter tonsillektomi og som kontakter AMK, skal hentes i ambulanse, **skal ha** PVK ([Barn og Nyfødt - Perifert venekateter](#), [Perifert venekateter - voksen](#)) og kjøres **direkte** til nærmeste sykehus med ØNH avdeling
- Disse pasientene kan ha sivblødd lenge og være allment påvirket

Tiltak

- La pasienten sitte oppreist/forhøyet hodeleie, gjerne lett framoverbøyd og spytte ut blodet
- Kjøl utsiden av halsen ned med en ispose eller et håndkle dyppet i kaldt vann
- La pasienten suge på isbiter

AMK varsler tidlig Vakthavende ØNH-lege om estimert ankomsttidspunkt (fordi de har hjemmevakt).

- For Oppland: Vakthavende SI-Gjøvik 911 69003
- For Hedmark: Vakthavende SI-Elverum 482 53118

Vakthavende ØNH-lege ønsker å bli holdt oppdatert av ambulanse om pasientens tilstand og være tilstede når ambulansen med pasienten ankommer. Spesielt viktig når det gjelder barn, da operasjonsstuen alltid skal klargjøres på forhånd.

For pasienter i Hedmark med geografisk kortere reisevei til Gjøvik enn til Elverum, kan det vurderes å frakte disse pasientene til SI-Gjøvik.

Utgave: 3.00	Prehospital - Blødning etter tonsillektomi	D42677 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

Referanser

[SI/17.34-01](#)

[Perifert venekateter \(PVK\): innleggelse](#)