



TAMIS (Transanal minimally invasive surgery) - Sykepleieprosedyre

D42850

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
13.03.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Transanal minimally invasive surgery (TAMIS) er et inngrep hvor man benytter en kirurgisk operasjonsteknikk for å fjerne store, premaligne svulster og polypper i endetarmen gjennom endetarmsåpningen, ved hjelp av endoskop.
- Prosedyren skal sørge for å kvalitetssikre forberedelsen av pasienten før operasjon og med hensyn til forebygging av komplikasjoner/infeksjoner postoperativt.
- Gjelder alle pasienter som skal gjennomføre inngrep som TAMIS.

Ansvar/målgruppe

- Helsepersonell i kliniske enheter som utfører prosedyren

Handling

Preoperativt

- Blodprøver «Kirurgisk innkomst» + CEA
- Utføre journalskriving og legemiddelsamstemming
- Opprette innkomst-/kartleggingsnotat, samt behandlingsplan
- EKG for pasienter over 80 år eller på indikasjon
- Full colontømming etter avdelingens prosedyre. Obs effekt av tømningmiddelet.
- Drikke kun klare drikker etter start av tømning
- 2 Pre-op drikker (Provide Extra)
- Ikke drikke 2t før operasjon. Ikke spise 6 t før operasjon.
- Innleggelse av PVK str. 1,2 (grønn)

Operasjonsdagen

- 1 Pre-op drikk (Provide Extra)
- 120 ml NaCl klyx
- Følge avdelingens sjekklister for kirurgiske inngrep
- Pasienten skal holde sengen etter han/hun er klargjort
- Gi premedikamentasjon 1 t før operasjon etter ordinasjon fra anesthesi
- Gi antibiotikaprofylakse etter prosedyre for gastrokirurgiske inngrep (se [Nasjonal veileder](#))
- Pasienten skal gå på toalettet før han/hun kjøres til operasjon
- Spise og drikke fritt etter operasjon
- Mobiliseres fritt etter operasjon
- Tromboseprofylakse avtales med operatør
- Evt. utskrivelse etter avtale med operatør

Første postoperative dag/utskrivelse

Utgave: 3.00	TAMIS (Transanal minimally invasive surgery) - Sykepleieprosedyre	D42850 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- Planlegge utskrivelse etter avtale med operatør
- Sykemelding
- Resepter på tromboseprofylakse, smertestillende og laxantia avtales med operatør
- Kontrolltime på poliklinikken for histologisvar og endoscopikontroll avtales med operatør i hvert enkelt tilfelle.

Referanser

[SI/17.27-04](#)

[SI/17.28-87](#)

[SI/21-02](#)

[Faste - før anestesi](#)

[Pasientinformasjon - Hjemreise etter mage/tarmoperasjon](#)

[Legemidler - Antibiotikabruk i sykehus, nasjonal faglig retningslinje, kortversjon](#)