



## TAMIS - Pre- og postoperativ sykepleie

D42850

 Utgave:  
4.00

 Gjelder fra:  
25.03.2026

Side 1 av 2

### Hensikt og omfang

- Sørge for å kvalitetssikre forberedelsen av pasienter som skal til TAMIS (transanal minimally invasive surgery) før operasjon og med hensyn til forebygging av komplikasjoner/infeksjoner postoperativt.

### Ansvar/målgruppe

- Helsepersonell i kliniske enheter som utfører prosedyren.

### Handling

#### Preoperativt

- Blodprøver «Kirurgisk innkomst» + CEA.
- Utføre journalskriving og legemiddelsamstemming.
- Opprette innkomst-/kartleggingsnotat, samt behandlingsplan.
- EKG for pasienter over 80 år eller på indikasjon.
- Full colontømming etter avdelingens prosedyre. Obs effekt av tømningmiddelet.
- Ved full tarmtømming gis Ringer Acetat 1000 ml tilsatt 20mmol KCL langsomt.
- Intravenøs væske ordineres i MetaVision.
- Drikke kun klare drikker etter start av tømning.
- 2 Pre-op drikker (Provide Extra).
- Ikke drikke 2t før operasjon. Ikke spise 6 t før operasjon.
- Innleggelse av PVK str. 1,2 (grønn).

#### Operasjonsdagen

- 1 Pre-op drikk (Provide Extra).
- 120 ml NaCl klyx.
- Følge avdelingens sjekklister for kirurgiske inngrep.
- Pasienten skal holde sengen etter han/hun er klargjort.
- Gi premedikamentasjon 1 t før operasjon etter ordinasjon fra anesthesi.
- Gi antibiotikaprofylakse etter prosedyre for gastrokirurgiske inngrep, se [Legemidler - Antibiotikabruk i sykehus, nasjonal faglig retningslinje](#)
- Pasienten skal gå på toalettet før han/hun kjøres til operasjon.
- Spise og drikke fritt etter operasjon.
- Mobiliseres fritt etter operasjon.
- Tromboseprofylakse avtales med operatør.
- Evt. utskrivelse etter avtale med operatør.

#### Første postoperative dag/utskrivelse

- Planlegge utskrivelse etter avtale med operatør.

Utgave: 4.00	<b>TAMIS - Pre- og postoperativ sykepleie</b>	D42850 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

- Sykemelding.
- Resepter på tromboseprofylakse, smertestillende og laxantia avtales med operatør.
- Kontrolltime på poliklinikken for histologisvar og endoscopikontroll avtales med operatør i hvert enkelt tilfelle.

## Referanser

[SI/17.28.03.09-16](#)  
[SI/21.01-44](#)

[Pasientinformasjon - Hjemreise etter mage/tarmoperasjon](#)  
[Legemidler - Antibiotikabruk i sykehus, nasjonal faglig retningslinje](#)