



Fødsel - Stimulering av rier

D43420

 Utgave:
4.00

 Gjelder fra:
14.10.2024

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Definere fødselens ulike faser og beskrive tiltak ved langsom fremgang.
- Prosedyren henviser direkte til aktuelt kapittel i [Fødselshjelp - Metodebok, Norsk gynekologisk forening](#)

Ansvar/målgruppe

- Leger og jordmødre

Handling

- Følg kapittel [Stimulering av rier](#)
- Se også:
 - [Svangerskap/fødsel/barsel - Legemidler, administrert av jordmor etter prosedyre](#)
 - [Partus - Hurtig registrering av Oxitocininfusjon i Parogrammet.](#)

Oxytocin

Utblanding	Dosering
<ul style="list-style-type: none"> • 10 IE (= 10000 mU) blandes i NaCl 0,9 % 1000ml eller Ringer Acetat 1000ml • Bruk infusjonspumpe 	<ul style="list-style-type: none"> • Startdose 30ml/time • Deretter øking hvert 15. minutt med 15ml/t • Maksdose 180ml/t

Referanser

[SI/15.03-61](#)
[SI/17.24-42](#)
[SI/17.24-86](#)

[Partus - Hurtig registrering av Oxitocininfusjon i Parogrammet.](#)
[Fødselshjelp - Metodebok, Norsk gynekologisk forening](#)
[Svangerskap/fødsel/barsel - Legemidler, administrert av jordmor etter prosedyre](#)