

## Øye - Diamox, Injeksjon

D43568

Utgave:  
2.02

Gjelder fra:  
17.06.2025

Side 1 av 1

### Hensikt og omfang

- Sikre riktig behandling med diamox injeksjon ved for høyt intraoculært trykk

### Ansvar/målgruppe

- Gjelder ansatte ved øyeavdelingene
- Øyelege har ansvar for å forordne medikament
- Sykepleiere har ansvar for å følge prosedyren

### Handling

- Diamox er et uregistrert preparat
- Diamox skal ikke gis til gravide da det kan gi elektrolyttforstyrrelser hos fosteret (1).
- Acetazolamid er et sulfaderivat og skal ikke brukes ved kjent følsomhet for sulfonamider (2).
- Klargjør nødvendig utstyr:
  - Diamox tørrstoff 500 mg
  - Sterilt vann
  - 1 opptrekkskanyle og 5 ml sprøyte
  - 10 ml sprøyte (Vurdere å ta opp)
  - NaCl 0,9 mg/ml
  - Utstyr til perifert venekateter
- Bland Diamox tørrstoff 500 mg i 5 ml sterilt vann
- Legg inn perifert venekateter, følg [Perifert venekateter \(PVK\): innleggelse](#)
- Administrer medikamentet langsomt intravenøst over 5 minutter
- Skyll perifert venekateter med 10 ml NaCl
- Fjern perifert venekateter, følg [Perifert venekateter \(PVK\): fjerning](#)

### Referanser

[SI/17.34-01](#)  
[SI/17.34-04](#)

[Perifert venekateter \(PVK\): innleggelse](#)  
[Perifert venekateter \(PVK\): fjerning](#)

1. Norsk legemiddelhåndbok. T7.9.1 Akutt vinkelblokkfall [Internett] [hentet 08.08.2022]. Tilgjengelig fra: <https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/T7.9.1>
2. Norsk legemiddelhåndbok. L7.3.1.1.1 Acetazolamid [Internett] [hentet 08.08.2022]. Tilgjengelig fra: <https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/L7.3.1.1.1>