


Legemidler - Blandekort, Acetylcystein

D44611

 Utgave:
5.00

 Gjelder fra:
08.05.2026

Side 1 av 1

R05C B01	ANTIDOT			
	ACETYLCYSTEIN Mucomyst (Viatriis) [®]			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet RT= Romtemperatur K= Kjøleskap	Merknader
200 mg/ml Inhalasjons- væske* i hetteglass	Må fortynnes videre før bruk <u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml NaCl 9 mg/ml <u>Paracetamolforgiftning</u> <u>IV infusjon:</u> 1. dose: 200 mg/kg fortynnes med 500 ml fortynningsvæske 2. dose: 100 mg/kg fortynnes med 1000 ml fortynningsvæske	Administreres med volumpumpe <u>IV infusjon ved paracetamolforgiftning**:</u> 1. dose gis over 4 timer 2.dose gis over 16 timer	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Hetteglass:</u> 24 timer K <u>Fortynnet løsning/ kontinuerlig infusjon:</u> Glukose 50 mg/ml: 24 timer RT NaCl 9 mg/ml: 16 timer RT	*Benyttes intravenøst ved paracetamol- forgifninger. En fargeforandring (lys rosa/lilla) kan oppstå i åpnet beholder, men dette påvirker ikke preparatets sikkerhet eller effekt. Kan gi kvalme, brekninger og hudreaksjoner (rødme, kløe, urticaria) **Hvis det er behov for forlenget infusjon eller høyere doser, se opplysninger i Behandlingsanbefaling fra Giftinformasjonen
Kilder: Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC) – Mucomyst Giftinformasjonen – Paracetamol - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket Legemiddelhandboka - G12.3 Antidoter – alfabetisk oversikt, bruksområde og dosering Legemiddelhandboka Maler i MetaVision				