


**Legemidler - Blandekort, Adenosin**

D44612

 Utgave:  
4.00

 Gjelder fra:  
16.06.2026

Side 1 av 1

C01EB01	INTENSIV/BILDEDIAGNOSTIKK			
	<b>ADENOSIN</b> Adenosin Life Medical® Adenosin Macure®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
5 mg/ml injeksjons- /infusjonsvæske  2 ml ampuller  10 ml og 50 ml hetteglass – brukes til diagnostiske undersøkelser	Gis ufortynnet  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml	<u>IV injeksjon ved PSVT*:</u> Skal gis på 1-2 sekunder, raskt etterfulgt av skylling med NaCl 9 mg/ml (ca 5 ml). Kan gjentas etter 1-2 minutter.  Bør gis i en sentral eller stor perifer vene.  <u>IV infusjon:</u> I forbindelse med myokardscintigrafi eller ekkokardiografi; infunderes intravenøst via en perifer vene. Normal infusjonshastighet bør være 140 mcg/kg/min.	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart  <u>Hetteglass:</u> 12 timer RT  Adenosin tåler ikke kald oppbevaring	Kontinuerlig EKG- overvåkning  Utstyr for resuscitering skal være tilgjengelig.  Kan gi dyspne, brystsmerter og flushing.  *PSVT = paroksysmal supraventrikkulær takykardi  Løsningen må ikke gis hvis det observeres partikler/utfellinger eller hvis løsningen er misfarget
<u>Kilder:</u> Norsk preparatomtale (SPC), Direktoratet for medisinske produkter: <a href="#">Adenosin Life Medical</a> og <a href="#">Adenosin Macure</a>				