


**Legemidler - Blandekort, Deksametason**

D44616

 Utgave:  
2.00

 Gjelder fra:  
29.07.2024

Side 1 av 1

H02AB02	AKUTTMOTTAK/INTENSIV/SENGEPOST			
	<b>DEKSAMETASON</b> Dexavit <sup>®</sup> , Dexacur <sup>®</sup>			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
4 mg/ml injeksjonsvæske  Ampuller 1 ml, 2 ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/m Glukose 50 mg/ml  <u>IV injeksjon:</u> Fortynnes i valgfri mengde fortynningsvæske ut fra praktiske hensyn (administrasjons-hastighet).  <u>IV infusjon:</u> Fortynnes i 100 ml fortynningsvæske*	<u>IV injeksjon:</u> Over minimum 1-3-5 minutter avhengig av dose. Doser over 8-12 mg bør helst gis over 10 minutter.  <u>IM injeksjon:</u> Kan gis intramuskulært men gir da langsommere absorpsjon  <u>IV infusjon:</u> Over minst 15-20 minutter.	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Kan gi umiddelbare brekninger og forbigående prikking eller brennende følelse i underlivet ved rask injeksjon.  Kan gi hyperglykemi, anafylaktiske reaksjoner og i sjeldne tilfeller sirkulatorisk kollaps.  *Ved å gi større doser i minst 250 ml over 30-60 minutter reduseres den brennende følelsen  Siste dose bør gis før kl 18 for å unngå søvnløshet.
Kilder: Preparatomtale <a href="#">Dexavit</a> UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide 2n ed 2007				