Legemidler - Blandekort, Digoksin

D44618	Utgave: 4.00	Gjelder fra: 16.06.2026	Side 1 av 1

C01AA 05	INTENSIV/SENGEPOST **DIGOKSIN** Lanoxin Aspen (uregistrert)			
Styrke	**Fortynning**	**Administrasjon**	**Holdbarhet** K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	**Merknader**
0,5 mg/2 ml = 0,25 mg/ml = 250 mcg/ml Injeksjonsvæske Ampuller, 2 ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon (metningsdose):</u> 1 del digoksin må fortynnes med minst 3 deler fortynningsvæske. <u>IV infusjon (vedlikeholdsdose):</u> Fortynnes i 50-100 ml fortynningsvæske	Gis på volum-/sprøytepumpe <u>IV injeksjon:</u> Over minst 10-20 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis vanligvis over 2 timer	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Rask administrasjon kan gi hypertensjon Kan gi svimmelhet, synsforstyrrelser, arytmier, kvalme og oppkast. Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Legemiddel-konsentrasjonen må monitoreres Inneholder etanol. For konsentrert løsning kan gi utfelling. Følg anbefalt fortynning. <u>Antidot:</u> Digifab ®

<u>Kilder:</u>
Preparatomtale Lanoxin Aspen
Medicines Complete
Maler i MetaVision