



Legemidler - Blandekort, Dopamin

D44619

Utgave:
4.00Gjelder fra:
08.05.2026

Side 1 av 1

C01CA04	INTENSIV			
	DOPAMIN Dopamin®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
10 mg/ml Infusjons- konsentrat 10 ml ampulle	Må fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml <u>Sprøytetpumpe:</u> Konsentrasjon 2mg/ml: 10 ml (= 100 mg) fortynnes med 40 ml fortynningsvæske <u>Volumpumpe:</u> Konsentrasjon 2mg/ml: 50 ml (= 500 mg) fortynnes i 200 ml fortynningsvæske	<u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Skal administreres med volum- eller sprøytetpumpe. Skal fortrinnsvis gis i sentral vene* <u>Infusjonshastighet:</u> Etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning/ kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT	Ekstravasasjon kan gi vevsskade Løsningen må ikke benyttes hvis den er misfarget. Kan unntaksvis gis i stor perifer vene, maksimalt 2-3 mg/ml
Kilder: Direktoratet for medisinske produkter, preparatomtale (SPC) – Dopamin UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide 3 rd ed 2010 Maler i MetaVision				