

Legemidler - Blandekort, Deksklorfeniramin

D44694

Utgave:
3.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

R06AB02	AKUTTMOTTAK/INTENSIV/SENGEPOST			
	DESKLORFENIRAMIN Deksklorfeniramin NAF, Dexclorfeniramina Maleato Accord (ureg.)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
5 mg/ml injeksjonsvæske 1 ml ampulle	Gis ufortynnet (SC/IM) eller fortynnes videre (IV) <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml 1 del Deksklorfeniramin 5 mg/ml fortynnes med 4 deler NaCl 9 mg/ml	<u>SC/IM injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV injeksjon:</u> Bør fortynnes. Gis langsomt over 1-5 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	Det kan oppstå en forbigående stikkende eller brennende følelse på injeksjonsstedet. Kan gi arytmier, hypotensjon, hjertebank, døsighet, urinretensjon, uklart syn, munntørrehet, kvalme, oppkast, diare og hodepine.
Kilder: Preparatomtale, SPC Dexclorfeniramina Maleato Accord Norsk legemiddelhåndbok Deksklorfeniramin Micromedex Medicines complete Maler i MetaVision				