

Legemidler - Blandekort, Heparin natrium

D44696

Utgave:
3.00

Gjelder fra:
17.06.2025

Side 1 av 1

B01AB01	INTENSIV				
	HEPARIN NATRIUM				
Heparin Panpharma/LEO 5000 E/ml, <i>konserverv</i>					
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader	
5000 E/ml injeksjonsvæske Hetteglass 5 ml	<u>IV bolus:</u> Gis ufortynnet. <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml <u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 500 E/ml: 5 ml fortynnes med 45 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 100 E/ml: 1 ml fortynnes med 49 ml fortynningsvæske <u>IV kontinuerlig infusjon, volumpumpe:</u> Konsentrasjon 40 E/ml: 4 ml fortynnes i 500 ml fortynningsvæske Må blandes godt. Vend posen/sprøyten minst 6 ganger frem og tilbake.	<u>IV bolus:</u> Gis over 3-5 minutter. Maks 10.000 E. <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Etter legens ordinasjon. Vanligvis initialt 18 E/kg/time, 1000-2000 E/time*	Holdbarhet er inkludert brukstid. <u>Hetteglass:</u> 28 dager K <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Overdosering/ alvorlige blødninger kan behandles med Protaminsulfat®. *Dosering justeres vha APTT (aktivert partiell tromboplastintid)-målinger. Ved subkutan administrasjon benytt LMWH (Fragmin eller Klexane).	
Kilder: Preparatomtale (SPC) – Heparin Panpharma og Heparin Leo Injectable Drugs Guide via Medicines Complete Micromedex via Helsebiblioteket Maler MetaVision					