


**Legemiddel - Octagam behandlingsskjema**

D44798

 Utgave:  
2.00

 Gjelder fra:  
14.05.2020

Side 1 av 2

**Behandlingsskjema Octagam**

- Det er flere indikasjoner for gammaglobuliner og ulik dosering
- Premedisinering er individuelt!
- Maks. hastighet er 4,8 ml/kg/time. Hos pasienter med primær immunsviktsyndrom som har tolerert en hastighet på 4,8 ml/kg/time godt, kan det gradvis økes til maks. 8,4 ml/kg/time
- Octagam bør være romtemperert når det gis

Navn:

Dato:                      Infusjon nr:    Vekt:

Octagam 100 mg/ml	g
----------------------	---

Evt premed: \_\_\_\_\_

Dosesjekk:                      /

Kur satt av:

Kl.	ml/kg/time	ml/time	BT	puls	Tp	Kommentarer
	0,6 i 30 min					
	1,2 i 10-15 min					
	2,4 i 10-15 min					
	3,6 i 10-15 min					
	4,8 i 10-15 min					Maks. hastighet
	6,0 i 10-15 min					
	7,2					
	8,4					Maks. hastighet ved primær immunsvikt

BT, puls og temp tas for å ha utgangsverdier. Ofte holder dette. Tas videre ved behov.

Batchnummer:

