

## Legemidler - Blandekort, Fomepizole

D44996

Utgave:  
3.00Gjelder fra:  
16.06.2026

Side 1 av 1

V03AB34	ANTIDOT			
	FOMEPIZOLE Fomepizole®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
Infusjonskonsentrat 5 mg/ml*  20 ml ampulle	Skal fortynnes  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml  <u>IV infusjon:</u> Bruk 500 ml infusjonspose, trekk først ut og kast en mengde tilsvarende volum av beregnet dose. Gjenværende volum av fortynningsvæske må være minimum 100 ml.	<u>IV infusjon:</u> Gis over 30-45 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT  <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer RT	*Svak konsentrasjon, det trengs mange ampuller for å få riktig dose.
<u>Kilder:</u> Direktoratet for medisinske produkter, preparatinformasjon (SPC): <a href="#">Fomepizole Serb</a> Giftinformasjonssentralen <a href="#">Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket</a> IBM Micromedex/Martindale via Helsebiblioteket				