



## Legemidler - Blandekort, Klonidin

D45162

Utgave:  
3.00Gjelder fra:  
20.11.2024

Side 1 av 1

C02AC01	INTENSIV			
	KLONIDIN HYDROKLORID Clotaxip®			
Styrke	Stamløsning og videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
150 mcg/ml Injeksjonsvæske  Ampuller a 1 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml  IV injeksjon: Gis ufortynnet eller fortynnet i egnet volum fortynningsvæske  IV kontinuerlig infusjon: <u>Sprøytepumpe:</u> <b>Konsentrasjon</b> <b>30 mcg/ml:</b> 10 ml (1500 mcg) fortynnes i 40 ml fortynningsvæske.	Bør gis i SVK eller stor perifer vene.  IV injeksjon: Gis over 10-15 minutter  IV kontinuerlig infusjon: Gis på sprøytepumpe. Etter legens ordinasjon.  Vanlig startdosering er 0,3-0,6 mcg/kg/time, med vedlikeholdsdose opptil 2 mcg/kg/time. Maksimaldose 3 mcg/kg/time	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Ampulle:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning/ Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT	Monitorer blodtrykk og hjerterefrekvens. Kan gi hypotensjon og bradykardi.  Trappes gradvis ned ved seponering (unngå hypertensiv krise).
<b>Kilder:</b> Preparatomtale (SPC) – <a href="#">Clotaxip</a> Fagprosedyre OUS: Håndtering av smerte, uro/agitasjon og delirium hos voksne intensivpasienter, ID 56319 Injectable Medicines Administration Guide 3rd ed 2010 Medicines complete, Critical Illness Maler i MetaVision				