


Legemidler - Blandekort, Labetalol

D45163

 Utgave:
4.00

 Gjelder fra:
16.06.2026

Side 1 av 1

C07AG01	AKUTTMOTTAK/INTENSIV/FØDE/NEUROLOGEN			
	LABETALOL HYDROKLORID Trandate®, Labetalol S.A.L.F®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
5 mg/ml Injeksjonsvæske 20 ml ampuller	Kan brukes ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml NaCl 9 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV infusjon, kontinuerlig, volumpumpe:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml: 200 mg (40 ml) blandes med 160 ml fortynningsvæske (trekk ut 90 ml av en 250 ml pose). <u>IV infusjon, kontinuerlig, sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 5 mg/ml Gis ufortynnet.	<u>IV injeksjon (bolus):</u> Gis ufortynnet i SVK eller stor perifer vene, langsomt over minst 1 minutt, helst 3-5 minutter. Maksimalt 50 mg/minutt <u>IV infusjon, kontinuerlig, volumpumpe:</u> Etter legens ordinasjon. Infusjonshastighet initialt 20 mg/time. Maksimalt 200 mg/t <u>IV infusjon, kontinuerlig, sprøytepumpe:</u> Gis i SVK eller stor perifer vene. Etter legens ordinasjon. Infusjonshastighet initialt 0,25mg/kg/time	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning/kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer RT	Tromboflebitt Ekstravasasjon kan gi vevsskade Monitorer hjerterefrekvens og blodtrykk Pasienten skal være liggende under administrasjon og minst 3 timer etter
Kilder: Norsk preparatomtale (SPC), Direktoratet for medisinske produkter: Trandate og Labetalol S.A.L.F. Micromedex Medicines complete Maler fra MetaVision				