



Øye - Glyserolbehandling, peroralt

D46405

 Utgave:
2.02

 Gjelder fra:
04.06.2023

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Sikre riktig behandling ved administrasjon av glyserol peroralt, som gis ved for høyt intraoculært trykk
- Gjelder for pasienter som behandles ved Øyeavdelingen

Ansvar/målgruppe

- Øyelege har ansvar for å forordne behandlingen
- Sykepleier på Øyeavdelingen har ansvar å utføre forordnet behandling

Handling

- Vurder behovet for innleggelse av perifer venekanyle – følg prosedyre [Perifert venekateter \(PVK\): innleggelse](#).
- Eventuelt: Gi pasienten Afipran 10 mg tbl. 10-15 minutter før glyserol gis, etter forordning fra lege. (Obs redusert nyre og leverfunksjon, se Felleskatalogen).
- Administrere Afipran 10 mg i.v. ved kvalme, forordnet av lege (Minimumsintervall på 6 timer mellom to administreringer skal opprettholdes, se Felleskatalogen).
- Måle opp Glyserol: 0,5 -1 ml/pr. kg kroppsvekt, etter forordning fra lege
- Blande Glyserolmengden i litt rød saft og vann og gi peroralt. Obs. diabetikere og blodsukker
- Seponer perifert venekateter dersom pasienten har hatt behov for dette. Følg prosedyre [Perifert venekateter \(PVK\): fjerning](#)

Referanser

[SI/17.34-01](#)
[Perifert venekateter \(PVK\): innleggelse](#)
[SI/17.34-04](#)
[Perifert venekateter \(PVK\): fjerning](#)

Felleskatalogen [Internett]. [hentet 04.06.2023] Tilgjengelig fra:

<https://www.felleskatalogen.no/medisin>