


Legemidler - Blandekort, Levosimendan

D46448

 Utgave:
2.00

 Gjelder fra:
16.11.2023

Side 1 av 1

C01CX08	Intensiv																																											
	LEVOSIMENDAN Levosimendan (Kalceks) [®] , Simdax (Orion) [®]																																											
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader																																								
2,5 mg/ml Infusjons-konsentrat Hetteglass, 5 ml	<p>Må fortynnes videre.</p> <p><u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml</p> <p><u>IV infusjon:</u> Konsentrasjon 0,05 mg/ml (=50 mcg/ml); 5 ml (= 12,5 mg) fortynnes i 245 ml fortynningsvæske.</p> <p>Maks konsentrasjon ved fortynning er 0,05 mg/ml.</p>	<p>Bør gis i sentral vene. Kan om nødvendig gis i en stor perifer vene. Administreres med volumpumpe.</p> <p><u>Ladningsdose IV infusjon*:</u> Vurderes individuelt etter klinikk. Vanlig dose er 6-12 mcg/kg. Gis over 10 minutter.</p> <p><u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon. Gis vanligvis over 24 timer.</p> <p>Infusjonshastighet: Vedlikeholdsdose er vanligvis 0,1 mcg/kg/min. Eller i området 0,05-0,2 mcg/kg/min avhengig av respons.</p> <p>Infusjonshastighet i ml/time:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vekt (kg)</th> <th>0,05 mcg/kg/min</th> <th>0,1 mcg/kg/min</th> <th>0,2 mcg/kg/min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>40</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td></tr> <tr><td>50</td><td>3</td><td>6</td><td>12</td></tr> <tr><td>60</td><td>4</td><td>7</td><td>14</td></tr> <tr><td>70</td><td>4</td><td>8</td><td>17</td></tr> <tr><td>80</td><td>5</td><td>10</td><td>19</td></tr> <tr><td>90</td><td>5</td><td>11</td><td>22</td></tr> <tr><td>100</td><td>6</td><td>12</td><td>24</td></tr> <tr><td>110</td><td>7</td><td>13</td><td>26</td></tr> <tr><td>120</td><td>7</td><td>14</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>	Vekt (kg)	0,05 mcg/kg/min	0,1 mcg/kg/min	0,2 mcg/kg/min	40	2	5	10	50	3	6	12	60	4	7	14	70	4	8	17	80	5	10	19	90	5	11	22	100	6	12	24	110	7	13	26	120	7	14	29	<p><u>Hetteglass:</u> Engangsbruk</p> <p><u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer RT</p>	<p>Moniterer EKG, blodtrykk, hjertefrekvens, serum kalium og urinproduksjon.</p> <p>Kan gi takykardi, arytmi, hypotensjon, hodepine, svimmelhet og kvalme.</p> <p>Konsentratet har en klar gul eller oransje farge.</p> <p>*Ladningsdose gis ikke ved hypotensjon.</p> <p>Effekt av endring i infusjonshastighet sees etter 30-60 minutter.</p>
Vekt (kg)	0,05 mcg/kg/min	0,1 mcg/kg/min	0,2 mcg/kg/min																																									
40	2	5	10																																									
50	3	6	12																																									
60	4	7	14																																									
70	4	8	17																																									
80	5	10	19																																									
90	5	11	22																																									
100	6	12	24																																									
110	7	13	26																																									
120	7	14	29																																									

Kilder:

 SPC, Statens legemiddelverk: Levosimendan Kalceks: [Levosimendan](#), Simdax: [Simdax](#)
 Maler fra MetaVision