



Legemidler - Blandekort, Nitroprussid

D46451

Utgave:
5.00Gjelder fra:
08.05.2026

Side 1 av 1

C02DD01	INTENSIV			
	NITROPRUSSID Nipruss®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
60 mg inf.subst. ampulle	<p>Må fortynnes videre</p> <p><u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml</p> <p>Bruk noen ml av fortynningsvolumet til å løse opp tørrstoffet i ampullen.</p> <p><u>Sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml: 60 mg fortynnes i 60 ml fortynningsvæske</p> <p>Konsentrasjon 0,5 mg/ml: 60 mg tørrstoff løses i 60 ml fortynningsvæske. 30 ml av denne løsningen fortynnes med 30 ml fortynningsvæske</p>	<p>Kun til intravenøs infusjon</p> <p><u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Bruk sprøytepumpe.</p> <p><u>Infusjonshastighet:</u> Gis etter legens ordinerings.</p> <p>Vanlig doseringsområde 0,3-8,0 mcg/kg/min</p>	<p>Holdbarhet er inkludert brukstid</p> <p><u>Fortynnet løsning:</u> 16 timer RT</p> <p>Forutsetter god nok lysbeskyttelse</p>	<p>Må lysbeskyttes etter utblanding og under infusjon (overtrekkpose eller aluminiumsfolie).</p> <p>Kan gi cyanidforgiftning ved langvarig infusjon og ved høy infusjonshastighet.</p> <p>Ferdig tilberedt infusjonsløsning er lysegul. Sterkt fargede infusjonsløsninger må ikke brukes.</p>
<p><u>Kilder:</u> Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC): Nipruss Medicines Complete ASHP Injectable medicines administration guide via Medicines Complete Maler i MetaVision</p>				