


Legemidler - Blandekort, Nitroprussid

D46451

 Utgave:
4.00

 Gjelder fra:
07.07.2024

Side 1 av 1

C02DD01	INTENSIV			
	NITROPRUSSID Nipruss®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
60 mg inf.subst. ampulle	Må fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml Bruk noen ml av fortynningsvolumet til å løse opp tørrstoffet i ampullen. <u>Sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml: 60 mg fortynnes i 60 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 0,5 mg/ml: 60 mg tørrstoff løses i 60 ml fortynningsvæske. 30 ml av denne løsningen fortynnes med 30 ml fortynningsvæske	Kun til intravenøs infusjon <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Bruk sprøytepumpe. <u>Infusjonshastighet:</u> Gis etter legens ordinerings. Anbefalt dosering 0,5-3,0 mcg/kg/min.	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Fortynnet løsning:</u> 16 timer RT Forutsetter god nok lysbeskyttelse.	Må lysbeskyttes etter utblanding og under infusjon (overtrekkspose eller aluminiumsfolie). Kan gi cyanidforgiftning ved langvarig infusjon og ved høy infusjonshastighet. Ferdig tilberedt infusjonsløsning er lysegul. Sterkt fargede infusjonsløsninger må ikke brukes.
Kilder: Norsk preparatomtale (SPC), Nipruss Blandekort Nipruss, e-håndboken OUS, september 2021 The College London Hospitals University Pharmacy Dep.: Injectable medicines administration guide, 3 rd ed. Wiley-Blackwell 2010 Maler i MetaVision				