



Legemidler - Blandekort, Pantoprazol

D46453

Utgave:
4.00Gjelder fra:
08.05.2026

Side 1 av 1

A02BC02	INTENSIV/SENGEPOST				
	PANTOPRAZOL Somac®, Pantoprazol®				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
40 mg Inf.subst Hetteglass	40 mg tørrstoff løses i 10 ml NaCl 9 mg/ml (= 4 mg/ml)	Kan gis uforynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> Natriumklorid 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Stamløsningen gis uforynnet <u>IV infusjon:</u> Konsentrasjon 0,4 mg/ml: 10 ml (= 40 mg) fortynnes i 100 ml fortynningsvæske* Konsentrasjon 0,8 mg/ml: 20 ml (= 80 mg) fortynnes i 100 ml fortynningsvæske <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Konsentrasjon 0,8 mg/ml: 20 ml (= 80 mg) fortynnes i 80 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 1,6 mg/ml: 20 ml (= 80 mg) fortynnes i 30 ml fortynningsvæske	<u>IV injeksjon:</u> Over minst 2-5 minutter <u>IV infusjon:</u> Over minst 15 minutter <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Gis på volum- eller sprøytepumpe. Etter legens ordinasjon, vanligvis 8 mg/time	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Stamløsning:</u> 12 timer RT <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer RT <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 12 timer RT	Stamløsningen har klar eller gulaktig farge. OBS! Tromboflebitt Ekstravasasjon kan gi vevsskade. *Ved bruk av NaCl 9 mg/ml som fortynningsvæske, kan hetteglasset løses direkte i posen
Kilder: Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC) – Somac og Pantoprazol Sun Injectable Medicines Administration Guide via Medicines Complete Lexicomp via Helsebiblioteket Maler i MetaVision					