

Operasjon - Lateksallergi - Forebygge anafylaktisk reaksjon

D46483

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
16.03.2026

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Sikre optimal behandling og hindre allergiske reaksjoner hos pasienter som har lateksallergi eller kan være disponert for lateksallergi.

Forebygge lateksallergi hos barn som er disponert for utvikling av lateksallergi eller har vært gjennom gjentatte operasjoner med nærkontakt med kirurgens latekshansker.

Ansvar/målgruppe

Kirurger, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere og rengjøringspersonell.

Handling

Risikogrupper

- Helsepersonell, spesielt operasjonspersonell, tannleger, laboratorieansatte, frisører og industriarbeidere
- Pasienter med flere operasjoner tidlig i livet (barn født med ryggmargsbrokk, misdannelser i urinveiene og liknende)
- Pasienter med gjentatte operasjoner og gjentatte kateteriseringer
- Atopikere og pasienter med astma/allergi
- Pasienter som har hatt anafylaktisk reaksjon uten kjent årsak
- Pollenallergikere
- Pasienter med spesiell matallergi (kryssreaksjon med lateks)

Kirurg

- Identifiserer pasienter som er i risikogruppen.
- Sette opp pasienten først på operasjonsprogrammet, da vi ikke kan garantere lateksfrie operasjonsstuer.
- Fyller ut Kritisk informasjon i DIPS, slik at det er tydelig i pasientens journal at pasienten har lateksallergi, [DIPS Arena - Kritisk informasjon](#)
- Gir muntlig beskjed til operasjonsstuen og skriftlig i operasjonsbestilling/operasjonssaken i DIPS ved øyeblikkelig hjelp, [DIPS Arena - Operasjonssak](#)

Før pasienten kommer til operasjonsavdelingen

Anestesi- og operasjonssykepleier:

- Identifiserer pasienter som er i risikogruppen.
- Fjern lateksholdig utstyr fra operasjonsstuen. Produktene må være merket lateksfritt. Obs! Produkter merket hypoallergic er ikke lateksfrie. Sjekk alle aktuelle produkter. Produsentene endrer stadig produkter og emballasje.
- Pasienten bør stå som nummer 1 på operasjonsprogrammet. Da er det minst frigjorte latekspartikler i rommet. Hvis ikke må stuen rengjøres godt (sluttvask) før pasienten tas inn.

Utgave: 1.00	Operasjon - Lateksallergi - Forebygge anafylaktisk reaksjon	D46483 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- Konfererer med kirurg og anestesipersonell om eventuelle lateksfrie alternativer hvis det man vanligvis bruker ikke er lateksfritt.
- Sørger for at alle, inklusiv renholdspersonalet, er orientert om situasjonen og tiltak.
- Sett skilt på dørene inn til aktuell operasjonsstue.
- Presiser behovet for god håndhygiene.

Rengjøringspersonell:

- Bruker lateksfritt utstyr/hansker under rengjøring av stue.
- Utfører sluttvask før pasienten kommer. Vasker spesielt håndtak, lysbrytere, telefon og andre punkter som kan ha vært eksponert for lateks.

Under operasjonen

Anestesi- og operasjonssykepleier:

- Benytt lateksfrie produkter
- Lateksfrie sterile og usterile hansker
- Urinkateter 100% silikon
- Lateksfritt plaster
- Lateksfrie overtrykkmansjetter, nesekateter, oksygenmaske, og annet ventilasjonsutstyr
- Dobbeltsjekke at alle produkter/utstyr som tas inn i operasjonsstuen er fri for lateks
- Unngå trafikk inn og ut av operasjonsstuen

Etter operasjonen

Anestesi- og operasjonssykepleier:

- Sørge for at forholdsregler blir videreført.
- Gi beskjed om pasientens lateksallergi til postoperativ og posten pasienten skal til etter operasjon.

Referanser

[SI/15.01-03](#)

[DIPS Arena - Kritisk informasjon](#)

[SI/15.01.02-11](#)

[DIPS Arena - Operasjonssak](#)

Litteraturliste

1. E-håndboken, OUS. Lateksallergi: Kirurgiske inngrep på pasienter med risiko for utvikling av latexallergi [Internett]. [Hentet 18.06.2025]. Tilgjengelig fra: [eHåndbok - Lateksallergi: Kirurgisk inngrep på pasient med risiko for utvikling av latexallergi](#)