



Øye - Dilatasjonskur - pupille

D46651

 Utgave:
2.02

 Gjelder fra:
24.05.2023

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Sikre riktig behandling av pasienter som gis dråpekur for åpning av pupille ved Øyeavdelingen.

Ansvar/målgruppe

- Øyelege har ansvar for å forordne medikamenter og aktuell behandling.
- Sykepleiere ved øyeavdelingen har ansvar for å utføre forordnet alternativ/ behandling.

Handling

- Informer pasienten om at dilatasjonskuren er ferdig etter ca. 10-30 minutter, avhengig av hvilket alternativ (A eller B) som forordnes av lege.
- Vurder smertestillende før kur. Ved behov: Administrer etter forordning fra lege.
- Drypp aktuelt øye med Oxibuprokain 4 mg/ml, 1-2 dråper, forordnet av lege.

Alternativ A

Drypp 1 dråpe hvert 5. minutt med:

- 1 dr. Atropin 10 mg/ml
- 1 dr. Tropicamid 5mg/ml
- 1 dr. Metaoxedrin 100 mg/ml
- 1 dr. Cyklopentolat 10 mg/ml

Total behandlingstid: 20 minutter.

Alternativ B

Bland sammen i et av minimispakningene:

- 1 dr. Metaoxedrin 100 mg/ml
- 1 dr. Cyclopentolat 10 mg/ml
- 1 dr. Tropicamid 5 mg/ml
- 1 dr. Atropin 10 mg/ml
 - Klipp en trekant av en spongopinne/vatt dott og fukt den godt med væskeblandingen
 - Legg avklipp av spongopinne/vatt dott under nedre øyelokk
 - Påse at pasienten holder øyet lukket
 - Husk å fjerne avklipp av spongopinne/vatt dott etter 10-15 minutter
 - Kan gjentas samme dag eller neste dag etter forordning fra lege

Referanser

Metodebok for øyesykdommer, Sesyn [Internett] [hentet 24,05.2023] Tilgjengelig fra: www.sesyn.no