



Øye - Endoftalmitt, forebyggende behandling m/Aprokam intrakameralt

D46658

Utgave:
2.01

Gjelder fra:
30.09.2025

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Sikre riktig istandgjøring og administrering av antibiotika som gis for å forebygge postoperativ endoftalmitt etter intraokulære operasjoner
- Gjelder for pasienter som behandles ved Øyeavdelingen

Ansvar/målgruppe

- Øyelege har ansvar for å ordinere og utføre behandlingen
- Sykepleier har ansvar for istandgjøring etter ordinering fra lege

Handling

- Løse opp ett hetteglass Aprokam 50 mg pulver, inneholder 50 mg cefuroxsim, i 5 ml NaCl 9 mg/ml. Bruk aseptisk teknikk.
- Benytt en filterkanyle (rødt hylster) til å trekke opp cefuroxsim fra hetteglasset. Dette er for å unngå eventuelle mikro-krystaller intrakameralt i øyet.
- Øyelege injiserer 0,1 ml (1 mg) med Aprokamoppløsning i forkammeret.
- Ved bilateral kataraktoperasjon skal det benyttes ulikt hetteglass med Aprokam 50mg til ulikt øye, samt 2 ulike hetteglass NaCl 9mg/ml
- Løsningen er holdbar ca. 5 timer i romtemp, og 24 timer i kjøleskap

Referanser