


Fødsel - Postpartumblødning, behandlingsskjema

D46830

 Utgave:
2.02

 Gjelder fra:
07.06.2023

Side 1 av 2

Pasient ID

Behandlingsskjema ved postpartumblødning

Brukes som hjelpeskjema.

All behandling skal dokumenteres i Partus.

DATO:	KL:	KL:	KL:	KL:
OKSYTOCIN <u>Dosering:</u> 50 IE (5 ampuller) <u>Utblanding:</u> NaCl 0,9% 500 ml <u>Administrering:</u> 150 ml/time				
TRANEKSAMSYRE (Cyklokapron®) <u>Dosering:</u> 1000 mg (1 ampulle à 10 ml/ 2 ampuller à 5 ml) <u>Ufortynnet:</u> Langsamt iv, 1ml/min <u>Utblanding:</u> Ev. NaCl 0,9% 100 ml, gis over 10 min. Kan gjentas etter 30 min.				
METHYLERGOMETRIN (Methergin®) <u>Dosering:</u> 0,2 mg (1 ampulle) im NB Kontraindisert ved preeklampsi/hypertensjon/ koronarsykdom				
KARBOPROST (Prostifenum®) <u>Dosering:</u> 0,25 mg (1 ampulle) <u>Administrering:</u> im/intramyometrielt. Kan gjentas etter 15-90 min. MAXDOSE 2 mg (8 ampuller)				
MISOPROSTOL (Cytotec®) <u>Dosering:</u> 0,6 mg (3 tabletter) Kan gjentas 2-4 ganger				
RINGER ACETAT <u>Dosering:</u> MAX 2 liter iv Tilstreb oppvarmet væske				
SPO2				
BT				
PULS				
URINKATETER				
BLODTAP, ML				

Utgave: 2.02	Fødsel - Postpartumblødning, behandlingsskjema	D46830 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

Referanser

[SI/17.24-29](#)

[Fødsel - Postpartum blødning \(PPB\)](#)