

Legemidler - Blandekort Tiamin, Vitamin B1

D48529

 Utgave:
4.00

 Gjelder fra:
08.05.2026

Side 1 av 1

A11D A01	SENGEPOST/INTENSIV			
	TIAMIN (Vitamin B1) Thiamine®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
50 mg/ml Inj.væske, ampulle 125 mg/ml Inj. væske, ampulle	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml (Glukose 50 mg/ml) <u>IM injeksjon</u> Gis ufortynnet <u>IV infusjon:</u> Dosen fortynnes i 50-100 ml fortynningsvæske	<u>IM injeksjon:</u> Gis langsomt intramuskulært <u>IV infusjon:</u> Gis over 30 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 8 timer RT	Kan gi alvorlige allergiske reaksjoner Gjentakende og/eller høye doser kan øke risiko for anafylaksi Ekstravasasjon kan gi vevsskade
Kilder: Direktoratet for medisinske produkter, norsk produktomtale (SPC) - Thiamine Sterop IBM Micromedex via Helsebiblioteket Maler i MetaVision				