



## Gynekologi - Forbehandling av cervix

D48572

Utgave:  
2.01Gjelder fra:  
13.12.2024

Side 1 av 1

### Hensikt og omfang

- Forebygge komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske prosedyrer med cervix dilatasjon, som laserasjon av cervix, falske kanaler eller perforasjon av uterus.

### Ansvar/målgruppe

- Leger og sykepleiere.

### Handling

#### Forbehandling med Misoprostol (Cytotec®)

- Cytotec® har mindre effekt hos postmenopausale kvinner, men kan benyttes spesielt ved lokal østrogenbehandling 14 dager før.
- Hos nullipara vil dette være spesielt viktig og kan også benyttes ved innleggelse av IUD.
- Pasienten får med seg Misoprostol (Cytotec®) 2 tabletter fra poliklinikken, eller får medikamentet tilsendt sammen med innkallingsbrev til poliklinisk konsultasjon. [Pasientinformasjon - Inngrep/behandling via livmorhalsen, forbehandling](#) legges ved innkallingsbrevet.
- Lege informerer om dette ved bestilling av time.

### Dosering

- Misoprostol (Cytotec®) 400µg vaginalt eller per os 2 – 4 timer før prosedyre gjennomføres, eventuelt kvelden før.

### Referanser

[SI/17.10-42](#)[SI/17.10-43](#)[SI/17.28.03.10-03](#)[Gynekologi - Metodebok, Norsk gynekologisk forening](#)[Gynekologi - Gynekologisk kreft – handlingsprogram](#)[Pasientinformasjon - Inngrep/behandling via livmorhalsen, forbehandling](#)