

Legemidler - Blandekort, Jern(III)hydroksidsukrosekompleks, Venofer

D48577

Utgave:
3.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

B03A C	SENGEPOST/POLIKLINIKK/INTENSIV			
	JERN(III)HYDROKSIDSUKROSEKOMPLEKS Venofer®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
20 mg/ml Injeksjonsvæske/-konsentrat, ampulle 5 ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre. <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV infusjon:</u> 5 ml (100 mg) fortynnes i maksimalt 100 ml fortynningsvæske 10 ml (200 mg) fortynnes i 100 ml (eller eventuelt 200 ml) fortynningsvæske Minimums-konsentrasjon: 1 mg/ml	<u>IV injeksjon (bolus):</u> Gis ufortynnet. Langsamt, over minst 5 minutter, men ikke raskere enn 20 mg/minutt. Høyst 2 ampuller per injeksjon. <u>IV infusjon:</u> 100 mg jern gis over minimum 15 minutter og 200 mg jern gis over minimum 30 minutter. Kan administreres direkte i veneslangen på dialyseapparatet, ved samme betingelser som ved iv injeksjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Tromboflebitt. Ektravasasjon kan gi smerte og vevsskade, brun misfarging av huden rundt injeksjonsstedet. Kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Anafylaksiberedskap må være tilgjengelig. Pasienten må observeres under og i minst 30 minutter etter avsluttet administrasjon. Ampuller med bunnfall må ikke benyttes
Kilder: Preparatomtale (SPC), Direktoratet for medisinske produkter: Venofer Brosjyre om intravenøst jern for helsepersonell: Sikkerhetsinfo IV jern Maler i MetaVision				