



Legemidler - Blandekort, Jern(III)karboksymaltose, Ferinject

D48590

Utgave:
3.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

B03A C	SENGEPOST/POLIKLINIKK/INTENSIV			
	JERN(III)KARBOKSYMALTOSE Ferinject®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjølekap RT= Romtemperatur	Merknader
50 mg/ml Injeksjons- væske Hetteglass, 10 og 20 ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre. <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV infusjon:</u> Fortynnes videre: ≤ 500 mg fortynnes i 100 ml fortynningsvæske > 500-1000 mg fortynnes i 250 ml fortynningsvæske Minimumskonsentrasjon: 2 mg/ml	<u>IV injeksjon (bolus):</u> Gis ufortynnet ≤ 500 mg gis over minst 5 minutter > 500-1000 mg gis over minst 15 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis over minimum 15 minutter Kan gis ufortynnet gjennom dialysator	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Hetteglass:</u> 12 timer RT 24 timer K <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Tromboflebitt. Ektravasasjon kan gi smerte, vevsskade og brun misfarging av huden rundt injeksjonsstedet. Kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Anafylaksiberedskap må være tilgjengelig. Pasienten må observeres under og i minst 30 minutter etter avsluttet administrasjon. Hetteglasset må være uten bunnfall og løsningen må være homogen ved bruk.
<u>Kilder:</u> Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC): Ferinject Micromedex via Helsebiblioteket Brosjyre om intravenøst jern for helsepersonell: Sikkerhetsinformasjon om IV jernpreparater Maler i MetaVision				