


Legemidler - Blandekort, Terlipressin,

D48698

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
08.05.2026

Side 1 av 1

H01B A04	INTENSIV/SENGEPOST				
	TERLIPRESSIN Glypressin®				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
Inj.subst. 1 mg pulver + væske (5 ml) Hetteglass	Tørrstoffet (1 mg) løses i medfølgende 5 ml oppløsningsvæske Konsentrasjon 0,2 mg/ml	<u>IV injeksjon/</u> <u>IV kontinuerlig infusjon</u> Gis uforynnet	Bør gis i SVK eller stor perifer vene <u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt over 3-5 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Stamløsning:</u> Brukes umiddelbart <u>Ampuller:</u> Engangsbruk	Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Kan etterskylles med NaCl 9 mg/ml
Inj.væske 1 mg/8,5 ml injeksjonsvæske Ampulle	Bruksferdig oppløsning Konsentrasjon 0,12 mg/ml		<u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Gis på sprøytepumpe etter legens ordinasjon	<u>Kontinuerlig infusjon:</u> 12 timer i RT	
Kilder: Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC) Glypressin Injectable Medicines Administration Guide via Medicines complete, ASHP Metodebok Varicer i øvre GI-tractus Micromedex via Helsebiblioteket Blandekort OUS Maler i MetaVision					