


Legemidler - Blandekort, Flekainid

D48700

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
16.06.2026

Side 1 av 1

C01B C04	INTENSIV/AKUTTMOTTAK			
	FLEKAINID Tambocor®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
10 mg/ml injeksjonsvæske, ampulle (15 ml)	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml * <u>IV bolus:</u> Gis ufortynnet eller fortynnes videre i inntil 100 ml <u>IV infusjon:</u> Konsentrasjon 1,5 mg/ml: 15 ml injeksjonsvæske 10 mg/ml fortynnes i 85 ml Glukose 50 mg/ml	<u>IV bolus-/initialdose:</u> Gis langsomt, over minst 10 minutter (10-30 minutter) <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer i RT <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> 24 timer i RT	Blodtrykk og hjerterytme skal monitoreres Økt risiko for bivirkninger ved rask IV administrasjon * Glukose 50 mg/ml anbefales både som fortynningsvæske og til skylling. NaCl 9 mg/ml kan unntaksvis brukes, men da må aldri mindre volum enn 500 ml NaCl benyttes pga risiko for utfelling.
Kilder: Norsk preparatomtale (SPC), Direktoratet for medisinske produkter Tambocor Injectable Medicines Administration Guide, 3rd ed				