

Legemidler - Blandekort, Flekainid, Tambocor

D48700

Utgave:
2.01Gjelder fra:
03.10.2023

Side 1 av 1

C01B C04		FLEKAINID Tambocor®			
Styrke	Stamløsning	Videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
10 mg/ml injeksjonsvæske, ampulle (15 ml)		Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml (*)	<u>IV bolus-/initialdose:</u> Gis langsomt, over minst 10 minutter (10-30 minutter) <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Etter legens ordinasjon	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer i RT <u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> 24 timer i RT	Blodtrykk og hjerterytme skal monitoreres Økt risiko for bivirkninger ved rask IV administrasjon
Konsentrasjon: 10 mg/ml					
<u>Kilder:</u> Statens legemiddelverk, norsk preparatomtale (SPC) – www.legemiddelverket.no januar 2020 Nasjonale blandekort for barn – www.legemidlertilbarn.no januar 2020 Injectable Medicines Administration Guide, 3rd ed					

Tilleggsopplysninger

Fortynningsforslag:

10 mg/ml, ampulle a 15 ml - fortynnes med Glukose 50 mg/ml til 100 ml.

Tilsetning til infusjonspose, trekk først ut tilsetningsvolum før tilsenting av flekainid.

150 mg : 100 ml = 1,5 mg/ml

(*) Glukose 50 mg/ml anbefales både som fortynningsvæske og til skylning. NaCl 9 mg/ml kan unntaksvis brukes, men da må aldri mindre volum enn 500 ml NaCl benyttes pga risiko for utfelling.

Enkelte intensivavdelinger har protokoller som avviker fra blandekortene, f.eks. ved væskerestriksjon. Disse protokollene kan benyttes i stedet for blandekort i henhold til avdelingens rutiner.