

Legemidler - Blandekort, Metoprolol, Seloken

D48701

Utgave:
2.00

Gjelder fra:
20.11.2024

Side 1 av 1

C07A B02	INTENSIV			
	METOPROLOLTARTRAT Seloken®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
1 mg/ml Injeksjons- væske Ampulle, 5 ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml Konsentrasjon 0,4 mg/ml: 40 mg (=40 ml) fortynnes i 60 ml fortynningsvæske (trekk ut 40 ml av 100 ml pose før tilsetning) Konsentrasjon 0,1 mg/ml: 25 mg (= 25 ml) fortynnes i 225 ml fortynningsvæske (trekk ut 25 ml av 250 ml pose før tilsetning)	<u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet, injeksjonshastighet 1-2 mg/minutt <u>IV infusjon:</u> Gis på volumpumpe Etter legens ordinasjon. Vanlig startdose 0,04 mg/kg/time, titreres opp til 0,1 mg/kg/time Ved langsom infusjon som substitusjon for oral dosering (i situasjoner som ikke haster), gis infusjon over 30-60 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer RT	Observasjon av blodtrykk og EKG
<u>Kilder:</u> Preparatomtale Seloken Injectable Medicines Administration Guide 3rd ed. UpToDate Metoprolol Maler i MetaVision				