

Legemidler - Blandekort, Amiodaron

D48713

 Utgave:
6.00

 Gjelder fra:
16.06.2026

Side 1 av 1

AKUTTMOTTAK/INTENSIV					
AMIODARON Amiodaron Hameln®					
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader	
50 mg/ml Injeksjons- væske/ infusjons- konsentrat ampulle a 3 ml	Ved A-HLR*/krisesituasjon, IV injeksjon: 150-300 mg. Gis uforynnet eller fortynnes i 10-20 ml fortynningsvæske Gis over minst 3 minutter, eventuelt som støt. Etterskyl med Glukose 50 mg/ml.		Holdbarhet er inkludert brukstid Ampuller: Engangsbruk Fortynnet løsning: 24 timer RT Kontinuerlig infusjon: 24 timer RT	Tromboflebitt, vevsirriterende Ekstravasasjon, kan gi vevsskade For rask IV injeksjon kan gi alvorlig hypotensjon og sirkulasjons- kollaps Uforlikelig med saltoppløsninger (NaCl), må derfor fortynnes i og etterskylles med glukose *A-HLR = Avansert hjerte- lunge-redning Krystallisering av amidaron er rapportert. Vurder bruk av in- line filter som ekstra forhåndsregel	
	Må fortynnes videre.				Administreres med volumpumpe. Gis i SVK eller stor perifer vene. IV infusjon: Initialdose gis over 30 minutter Kontinuerlig infusjon/ Vedlikeholds- dose: Gis over 24 timer eller etter legens ordinasjon
	Fortynningsvæske: Glukose 50 mg/ml				
	Initialdose:				
	PVK	SVK			
	300 mg (6 ml) fortynnes i 244 ml fortynningsvæske (trekk ut 6 ml av 250 ml pose før tilsetning)	300 mg (6 ml) fortynnes i 94 ml fortynningsvæske (trekk ut 6 ml av 100 ml pose før tilsetning)			
Vedlikeholdsdose:					
PVK	SVK				
600 mg (12 ml) fortynnes i 488 ml fortynningsvæske (trekk ut 12 ml av 500 ml pose før tilsetning)	600 mg (12 ml) fortynnes i 238 ml fortynningsvæske (trekk ut 12 ml av 250 ml pose før tilsetning)				
900 mg (18 ml) fortynnes i 482 ml fortynningsvæske (trekk ut 18 ml av 500 ml pose før tilsetning)	900 mg (18 ml) fortynnes i 232 ml fortynningsvæske (trekk ut 18 ml av 250 ml pose før tilsetning)				
1200 mg (24 ml) fortynnes i 976 ml fortynningsvæske (trekk ut 24 ml av 1000 ml pose før tilsetning)	1200 mg (24 ml) fortynnes i 226 ml fortynningsvæske (trekk ut 24 ml av 250 ml pose før tilsetning)				

Kilder:

 Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC): [Amiodaron Hameln](#)

Medicines Complete

Maler i MetaVision