



Smittevask - rekvisisjon med forklaring

D49585

Utgave:
1.02

Gjelder fra:
17.09.2025

Side 1 av 2

FYLLES UT AV PASIENTANSVARLIG

Avdeling/post:..... Rom/stue nr:.....

OBS – kun ett kryss per punkt

1	☐ Kontaktsmitte (oransje) ☐ Dråpesmitte (rosa) ☐ Luftsmitte (rød)
2	☐ DNA sanering (verneutstyr: medisinsk munnbind, frakk, hansker, hette og skoovertrekk)
3	Desinfeksjonsmiddel se side 2: ☐ Virkon 1% - virketid 10 minutter dreper bakterier, sopp og virus – unntatt tuberkulose og sporer som Clostridioides difficile. ☐ PeraSafe - virketid 10 minutter (dreper bakterier, inkl. tuberkulose, virus, sopp, og sporer som Clostridioides difficile. ☐ Desinfeksjonsrobot - virketid 2 – 4 timer. (rekvireres mandag-fredag innen kl 14) ☐ Klorin 1% (NB kun til DNA sanering)
4	Skal gardiner tas ned? ☐ JA ☐ NEI se side 2
5	Medisinsk-teknisk utstyr er påført desinfeksjonsmiddel (Virkon eller PeraSafe) eller emballert og fraktet til desinfeksjonsrommet? Ansvar: pleiepersonalet. ☐ JA

Rommet vil være ryddet og klargjort for desinfeksjon klokken:

Eventuelle andre opplysninger:

Rekvirert telefonisk/kontakt med renholder i avdelingen:

Dato: Klokke:

Rekvirert av:

Smitteregime	Desinfeksjonsmiddel
Luftsmitte (rød)	• <u>PeraSafe 10 min ved tuberkulose</u>
Dråpesmitte (rosa)	• Virkon 1% 10 min.
Kontaktsmitte (oransje)	• Virkon 1% 10 min • PeraSafe 10 min
Desinfeksjonsrobot er et alternativ til manuell desinfeksjon som <i>kan</i> brukes etter alle smittomme sykdommer inkl.tuberkulose. (sjekk med leverandør av din desinfeksjonsrobot om det skulle være noen unntak)	Desinfeksjonsrobot • Kan anbefales etter MRSA, Norovirus, Clostridioides difficile, tuberkulose og resistente tarm-, miljømikrober (ESBL/VRE). • Synlig rene gardiner/forheng kan henge oppe.

Ved manuell desinfeksjon skal gardiner og forheng tas ned:

- Etter dråpe- og luftsmitte
- Generelt når pasienten har vært isolert over lang tid (uke/mnd)
- Ved mistanke om at smittestoff befinner seg på gardinene/synlig tilsølt
- **Evt. dusjforheng og skjerm Brett skal alltid desinfiseres ved smitteopphør.**

Referanser

[EiS07.01.03-01](#)

[EX.01.02-02](#)

[EX.01.02-03](#)

[EX.01.07-06](#)

[EX.01.07-07](#)

[EX.01.13-14](#)

[Desinfeksjonsrobot, praktisk bruk og rekvirering](#)

[Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask](#)

[Basale smittevernrutiner - Usterile engangshansker](#)

[Plakat smittevernutstyr - TA PÅ](#)

[Plakat smittvernutstyr - TA AV](#)

[Isolering - daglig rengjøring og desinfeksjon hos isolerte pasienter](#)