


Legemidler - Blandekort, Remifentanil

D49896

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
08.05.2026

Side 1 av 2

N01AH06	INTENSIV/ANESTESI			
	REMIFENTANIL Ultiva Aspen, Ultiva 2care4, Remifentanil Hameln			
Styrke	Stamløsning og videre fortykning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
1 mg 2 mg 5 mg Injeksjons- substans/ pulver til injeksjon/ infusjon Hetteglass	<p><u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml (Glukose 50 mg/ml)</p> <p><u>Sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 100 mcg/ml (Intensiv) 5 mg løses opp i 50 ml NaCl 9 mg/ml</p> <p>Konsentrasjon 50 mcg/ml (Anestesi) 2 mg løses opp i 40 ml NaCl 9 mg/ml</p> <p>Bland godt i hetteglass/sprøyte</p> <p><u>Ved eventuell bruk av stamløsning:</u> Injeksjonssubstansen oppløses i fortynningsvæske til en konsentrasjon på 1 mg/ml: 1 mg løses i 1 ml 2 mg løses i 2 ml 5 mg løses i 5 ml Bland godt!</p> <p>Stamløsningen må fortynnes videre til en konsentrasjon på 20-250 mcg/ml før bruk</p>	<p>Kun til IV bruk</p> <p>Gis via SVK eller i en stor perifer vene</p> <p><u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Skal administreres på sprøytepumpe</p> <p><u>Infusjonshastighet:</u> Gis etter legens ordinasjon og/eller etter protokoll</p> <p>Infusjonshastighet kan justeres med 0,025 mcg/kg/minutt hvert 5. minutt</p>	<p><u>Stamløsning, hetteglass:</u> 24 timer K/RT</p> <p><u>Fortynnet løsning/ kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer RT</p>	Etter rekonstituering skal løsningen være klar og fargeløs.
<p><u>Kilder:</u> Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC) - Ultiva og Remifentanil hameln ASHP Injectable Drug Information via www.medicinescomplete.com Maler i MetaVision</p>				

Utgave: 3.00	Legemidler - Blandekort, Remifentanil	D49896 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------