

Operasjon - Plastikk fjernelse i ansikt

D50896

Utgave:
2.00

Gjelder fra:
02.06.2025

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre at prosedyren utføres korrekt

Ansvar/målgruppe

- Sykepleier og lege ved kirurgisk poliklinikk Hamar

Handling

- Sykepleier legger opp instrumenter, sjekker instrumenter og setter på knivblad
- Utfør identitetssjekk på pasient
- Legg pasienten i godt leie, desinfisere operasjonsfelt. Vask hele ansiktet.
- Desinfeksjonsvæske som benyttes.
 - Ansikt: Klorhexidin 1 mg/ml
 - Slimhinner: Klorhexidin 0,5 mg/ml
 - Øvrig kropp: Klorhexidin 5m/ml med eller uten farge
- Ved histologi, bruk glass med formalin

Utstyr

- Ansiktsbrikke
- Plastikk tralle
- Klinikk duk 75x90 2 stk
- Klinikk duk 75x75 med limkant 1 stk
- Standard frakker
- Vaskesett
- Steril tusj
- Grå kanyler
- Opptrekkskanyler
- Sprøyte 5 cc luer lokk 1 stk
- Sprøyte 20 cc 1 stk
- Knivblad 15
- Lokalbedøvelse:
 - Lokalbedøvelse 20 ml Xylocain 10 mg/ml med adrenalin + 4 ml natriumhydrogenkarbonat 0.5mmol/ml
- Suturer: Spør operatør
- Bandasje: Opsite plasterspray, eventuelt Rudanath strips eller brun micropore tape.

Dekking

Operatør vil se hele ansiktet. Lag en trekant av 75x90 legg under pasientens hode og fest på toppen/panna med en pean.

Utgave: 2.00	Operasjon - Plastikk fjernelse i ansikt	D50896 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

Referanser

[SI/17.16.07-01](#)

[SI/17.34-01](#)

[Histologisk undersøkelse - generell informasjon](#)

[Desinfeksjon av hud](#)